

AV^{max} GREEN GUARDIAN

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE

AV MAX GREEN GUARDIAN es un corrector de carencias nutricionales diseñado para proporcionar a las plantas elementos esenciales para un crecimiento equilibrado y saludable. Este producto está enriquecido con Cobre, Zinc, Manganeseo, ácidos orgánicos, cítricos, y extracto de algas. Gracias a su formulación única **AV MAX GREEN GUARDIAN** mejora la nutrición de las plantas, optimizando su vigor y desarrollo general. Además, contribuye a la mejora de la calidad del cultivo y la resistencia a condiciones adversas como el estrés ambiental y la alta humedad.



CONTAMINANTES				
Metales Pesados (mg/kg)				Parámetros físicos - químicos
Cd: <0,01	Ni: <0,03	As: <0,02	CR Total: <0,03	pH: 2,5-3,5
Hg: <0,01	Pb: <0,02	Cu: <1,0		Da a 20°C: 1,3-1,5 g/L

COMPOSICIÓN	p/v
Ácido cítrico	21,5%
Ácidos orgánicos vegetales.	18,5%
<i>Macrocystis Pyrifera</i>	15,0%
Zinc (Zn)	4,7%
Cobre (Cu)	2,5%
Manganeseo (Mn)	0,3%

Manejo del producto y Aplicación



BENEFICIOS:

- **Corrección de Carencias:** Aporta Cobre, Zinc, y Manganeseo en formas altamente disponibles para corregir deficiencias nutricionales.
- **Mejora en la Calidad del Cultivo:** Contribuye a un crecimiento más vigoroso y una mejor calidad de frutos o flores.
- **Soporte contra Estrés:** Por variaciones climáticas.
- **Mejoran la resistencia al estrés abiótico:** Los extractos de algas y los ácidos cítricos contienen antioxidantes que ayudan a las plantas a enfrentar condiciones adversas como alta humedad atmosférica y temperatura.



FICHA TÉCNICA

Macrocystis Pyrifera

AgroVeca
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

AVmax GREEN GUARDIAN

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE ÁCIDO CÍTRICO, ÁCIDOS ORGÁNICOS, EXTRACTO DE ALGAS, COBRE, ZINC Y MANGANESO.

Se recomienda aplicar este corrector de carencias cuando se identifiquen signos de deficiencia o se anticipen condiciones adversas que puedan afectar la salud y productividad del cultivo.

AV MAX GREEN GUARDIAN contiene extracto de alga (*Macrocystis pyrifera*), que actúa estimulando y equilibrando sus funciones metabólicas a nivel de las células de manera integral, desarrollando su potencial productivo frente al estrés abiótico. Este efecto se traduce en un adecuado desarrollo de la planta.

Para aplicación vía foliar agregar al estanque del equipo a media capacidad con el agitador funcionando y luego completar con el agua faltante.

FITOTOXICIDAD: No presenta toxicidad si se aplica según indicaciones de etiqueta y ficha técnica. No es tóxico para las plantas ni animales.

MOJAMIENTO

Frutales mayores.....1000-3500 L/ha.
Hortalizas, praderas, viveros..... 400-1000 L/ha.

*Puede variar según condiciones locales, tipo de cultivo específico y equipo de aplicación disponible.

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
FOLIAR
L/ha

Uva de mesa, Vinífera,
Pisquera, Kiwi.

1° aplicación en cuaja
2° aplicación en cierre de racimo
3° aplicación en precosecha.

2 - 4

Durazno, Damasco, Ciruelo,
Cerezo, Nogal, Almendro,
Avellano, Pecano, Higuera,
Caqui, Nectarín, Chirimoyo,
Manzano, Granadas, Peral,
Membrillo.

1° aplicación en caída de hojas y/o inicio de brotación. (Según condición del cultivo).
2° aplicación en botón rosado y/o plena flor.
3° aplicación en crecimiento de fruto.
*Aplicar en dosis mayor en post cosecha, 30 días antes del inicio de caída de hoja, dependiendo de la condición del cultivo.

2 - 4

Mango, Palto, Mandarino,
Limón, Naranja, Pomelo,
Tangelo, Clementina, Olivo,
Papayo.

1° aplicación a inicios de crecimiento de brote en primavera.
2° aplicación a los 10 a 14 días después.
3° aplicación repetir durante crecimiento de brote de verano - otoño.

2 - 4

FICHA TÉCNICA

Macrocystis Pyrifera

AgroVeca
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
FOLIAR
L/ha

Arándano, Franbuesa, Fresa
(Frutilla), Mora, Grosella,
Murta, Zarparrilla.

1° aplicación a inicios de brotación y preflor.
2° aplicación repetir cada 10-14 días después hasta
cosecha.
*Hacer una aplicación en post cosecha, 30 días
antes del inicio de caída de hoja.

2 - 4

Pepino dulce, Paprika, Acelga,
Lechuga, Espárrago, Tomate,
Achicoria, Berenjena, Endivia,
Pimiento, Espinaca, Apio, Ají,
Cucurbitáceas, Brásicas,
Papa, camote, Leguminosa.

1° aplicación al inicio de desarrollo vegetativo
2° aplicación a los 7-14 días después, y repetir hasta
cosecha.

1 - 3

Trigo, Avena, Cebada,
Arroz, Maíz.

1° aplicación desde aparición de 2 a 4 hojas.
2° aplicación en emergencia de macolla.
3° aplicación en extensión de tallo.
4° aplicación en emergencia de espiga, se puede mezclar
con fitosanitarios de uso común.

2 - 3

Remolacha azucarera,
Viveros, Praderas,
Aliáceas, Flores bulbosas.

1° aplicación desde comienzos del desarrollo vegetativo.
2° aplicación a los 7 - 14 días después, según las condiciones
de cultivo máximo 2-3 aplicaciones.

1 - 3

Flores de corte.

1° aplicación a inicios de desarrollo vegetativo.
2° aplicación a los 7-14 días después, hasta completar 4-5
aplicaciones dependiendo de las condición de cultivo.

1 - 3

FORMATOS





Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a:
contacto@agrovecalatam.com

Formulado en Chile por AGROVECA SPA.
Membrillar 50, oficina 39. Rancagua - Chile.

Distribuido por Agroveca Perú SAC.
Calle Martir Olaya Nro.129 Int.1905 - Lima - Lima - Miraflores.