

AV Plus POTASIO

FERTILIZANTE/ BIOESTIMULANTE

AV PLUS POTASIO, es un Fertilizante/Bioestimulante foliar con alto contenido de Potasio y extracto de algas, que logra una mayor asimilación por el cultivo. Está especialmente recomendado para todo tipo de cultivos con bajo vigor, poco calibre y falta de color, favorece la formación y traslocación de carbohidratos (azúcares). Mejora la resistencia al estrés por falta de agua, ya que mantiene el potencial de soluto en los tejidos conductores.



CONTAMINANTES			
Metales Pesados (mg/kg)			Parámetros físicos - químicos
Cd: <0,01	Ni: <0,03	As: <0,02	CR Total: <0,03
Hg: <0,01	Pb: <0,02	Cu: <1,0	pH: 4,5-5,5
			Da a 20°C: 0,975-1,175 g/L

COMPOSICIÓN	p/v
Macrocystis Pyrifera	20,0%
Potasio (K ₂ O)	25,0%

Manejo del producto y Aplicación	
	

BENEFICIOS:

- Fuente directa de Potasio.
- Favorece la economía de agua ya que regula la apertura y cierre de estomas, favoreciendo la turgencia de los tejidos.
- Ayuda al movimiento de azúcares al fruto favoreciendo color, sabor y crecimiento celular.
- Aumenta tolerancia a variaciones térmicas abruptas.
- El Potasio es cofactor de mas de 40 enzimas, relacionadas al metabolismo de los carbohidratos.



AV Plus POTASIO

MEZCLA DE FERTILIZANTE INORGÁNICO, COMPUESTO POR MACRONUTRIENTES + BIOESTIMULANTE NO MICROBIANO.

Las deficiencias de potasio se observan como amarillamiento en los bordes de las hojas, especialmente las más viejas, estos se vuelven marrones y mueren. Los tallos se vuelven delgados, menos rígidos y con un menor desarrollo, doblándose fácilmente. Se observan frutos más pequeños y de menor calidad. Se puede observar curvatura en las hojas y aparición de manchas que luego se necrosan.

AV PLUS POTASIO contiene extractos de *Macrocystis pyrifera*, cuyos compuestos activos generan un efecto sinérgico actuando a nivel celular estimulando diversos procesos, ayudando a la planta a una mejor absorción, transporte de nutrientes y aumentando su poder antioxidante.

Para aplicación vía foliar agregar al estanque del equipo a media capacidad con el agitador funcionando y luego completar con el agua faltante.

FITOTOXICIDAD: No presenta toxicidad si se aplica según indicaciones de etiqueta y ficha técnica. No es tóxico para las plantas ni animales.

MOJAMIENTO

Frutales mayores.....	1000-3500 L/ha.	*Puede variar según condiciones locales, tipo de cultivo específico y equipo de aplicación disponible.
Hortalizas, praderas, viveros.....	400-1000 L/ha.	

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
FOLIAR
L/ha

Uva De Mesa, Vinífera, Pisquera.	Aplicar durante el periodo de madurez de los frutos, desde inicio de envero y repetir cada 7-10 días, realizar de 2-5 aplicaciones.	2 - 6
Manzano, Peral, Membrillo, Ciruelo, Durazno, Damasco, Nectarín, Avellano, Limón, Almendro, Cerezo, Pomelo, Nogal, Pecano, Granado, Higuera, Caqui, Naranja, Palto, Mandarino, Tangelo, Clementina, Chirimoyo, Papayo.	4-8 tratamientos cada 15 días, primera aplicación después de cuaja, hasta completar 20-40 L/ha/ciclo.	2 - 6
Arándano, Frambuesa, Mora, Grosella, Frutilla, Murta, Zarzaparrilla.	Aplicar desde inicio de quiebre de color. Repetir cada 10 días hasta llegar a cosecha.	2 - 6

FICHA TÉCNICA

Macrocystis Pyrifera

AgroVeca
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
FOLIAR
L/ha

Olivo	Aplicar durante el periodo de maduración de los frutos e ir repitiendo cada 7-10 días hasta completar 2-4 aplicaciones.	2 - 6
Mango	Aplicación mínima de 3 tratamientos a los 60, 45 y 30 días antes de cosecha.	2 - 6
Kiwi	Realizar de 3-5 aplicaciones desde crecimiento la madurez de fruto	2 - 6
Pradera, Alfalfa, Raps, Maíz, Trigo.	Junto a fitosanitarios.	2 - 6
Remolacha Azucarera	1º aplicación en formación de tubérculo. 2º aplicación repetir cada 15 días, aplicar de 4 a 6 repeticiones, hasta completar de 20-30 L/ha/ciclo.	2 - 6
Aliícea, Lechuga, Apio, Endivia, Acelga, Achicoria, Espinaca, Alcachofa, Zanahoria, Brássica, Espárrago.	Realizar 3-5 aplicaciones desde primeras hojas verdaderas hasta precosecha	2 - 6
Zapallo, Zapallo Italiano, Melón, Sandía, Pepino, Ají, Tomate, Pimiento, Pepinillo, Paprika, Berenjena.	Durante crecimiento de fruto repitiendo cada 14 días.	2 - 6
Papa, Camote.	1º aplicación 45 días antes de cosecha. 2º aplicación 30 días antes de cosecha. 3º aplicación 15 días antes de cosecha.	2 - 6

FICHA TÉCNICA

Macrocystis Pyrifera



RECOMENDACIÓN DE USO		DOSIS FOLIAR L/ha
Flor Bulbosa.	Aplicar de 30 - 15 días antes de cosecha.	2 - 6
Flores De Corte.	1° aplicación en aparición de la cápsula floral. 2° aplicación a los 15 días, repetir de 4-6 tratamientos, hasta completar 20-30 L/ha/ciclo.	2 - 6

FORMATOS





Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a:
contacto@agrovecalatam.com

Formulado en Chile por AGROVECA SPA.
Av. Membrillar N°50, oficina 39, Rancagua - Chile.