

PROGRAMA NUTRICIONAL Y BIOESTIMULACIÓN UVA VINÍFERA Y PISQUERA



AV

SOLUCIONES SIN ESTRÉS

ESTADO FENOLÓGICO	PRODUCTOS	FUNCIÓN EN LA PLANTA	DOSIS L/HA
YEMA ALGODONOSA	Bioveca Praderas Bioveca Invernal	Microorganismos inductores de defensas. Microorganismos benéficos.	250 gr 250 gr
PRIMAVERA- VERANO. BOTE DE 5-15 CM	Veca Amin Veca Plus Zinc Veca Plus Boro VecaSil Forte Algap 30	Aminoácidos para estimular crecimiento. Mejorar floración y cuaja. Mejorar floración y cuaja. Protección y estimulación vegetal. Desestrés para óptimo crecimiento vegetal.	3 3 3 5 3
BROTE 15 A 30 CM	Algap 30 Veca Plus Zinc PK Defend Max Veca Plus Boro Veca Amin	Desestrés para óptima floración y cuaja. Mejorar floración y cuaja. Activar SAR (Resistencia sistémica Adquirida). Mejorar floración y cuaja. Aminoácidos para estimular crecimiento.	3 3 5 3 3
PRE-FLOR 5% FLORACIÓN	Veca Plus Boro Bioveca Praderas Veca Plus Zinc Bioveca Foliar	Mejorar floración y cuaja. Microorganismos inductores de defensas. Mejorar floración y cuaja. Protección foliar frente a hongos.	3 250 gr 3 250 gr
PLENA FLOR	Veca Plus Boro Veca Plus Zinc Veca Amin Veca Root Max Bioveca Raíz	Mejorar floración y cuaja. Mejorar floración y cuaja. Aminoácidos para estimular crecimiento. Aumentar crecimiento radicular. Protección y estimulación radicular.	3 3 3 4 500 gr
POST CUAJA 3-8 MM	Veca Plus Magnesio Algap 30	Aumentar de fotosíntesis. Desestrés para un óptimo crecimiento de bayas.	3 3
POST CUAJA 8-15 MM	Veca Plus Magnesio Algap 30	Aumentar de fotosíntesis. Desestrés para un óptimo crecimiento de bayas.	3 3
ABLANDE GENERALIZADO	Veca Move Veca Plus Potasio Bioveca Foliar	Producción y movimiento de azúcares. Movimiento de azúcares. Aumentar crecimiento radicular.	5 5 250 gr

Recomendaciones

Se recomienda Vecamin Sugar a dosis de 4L/ha en los flush radicales o en conjunto con las aplicaciones de Veca Root Max, con la finalidad de aumentar el potencial osmótico de la raíz, para promover la absorción de agua y nutrientes sin un mayor gasto energético.

Aplicar Veca Bloom 2-3 aplicaciones a dosis de 3L/ha a variedades de baja cuaja o con pocas bayas por racimo.

Para suelos compactos y de poca estructura aplicar Veca humic Root 10-20 L/ha mensual, hasta completar 60-100 L/ha por temporada.

Si presenta síntomas de Nemátodos en las raíces (curvaturas o pequeñas protuberancias), realizar 2 aplicaciones cada 30 días de Bioveca NemaOFF, para controlar taque y disminuir muerte de pelos absorbentes. En el caso de observar en el suelo larvas o gusanos blancos aplicar 2/3 aplicaciones cada 30 días, un sobre de 500 gr/ha de Bioveca Praderas para controlar y disminuir la muerte de pelos absorbentes.



Aplicación radicular

Aplicación Foliar

Muchos de nuestros productos Agroveca pueden ser aplicados de manera foliar y radicular, dependiendo del momento de aplicación o lo que se desea conseguir, busca asesoramiento con equipo Agroveca, para mejores resultados.

Contacto para mayor información

Contacto@agroveca.cl

Contacto@agroveca.com.pe

www.agroveca.cl

AV SOLUCIONES SIN ESTRÉS