

AV Plus ZINC

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE

AV PLUS ZINC ayuda a mantener la integridad de las membranas celulares de las plantas y mejora su tolerancia al estrés ambiental, favoreciendo la polinización y la cuaja. Contiene extracto de algas, cuyos ingredientes activos se potencian en la mezcla para estimular procesos celulares claves. Este producto mejora la absorción y transporte de nutrientes, incrementa el poder antioxidante de la planta y contribuye a un crecimiento equilibrado y saludable. **AV PLUS ZINC** es esencial para la síntesis de proteínas, formación de clorofila, regulación de hormonas, metabolismo de carbohidratos, y síntesis de ácidos nucleicos.



CONTAMINANTES				
Metales Pesados (mg/kg)				Parámetros físicos - químicos
Cd: <0,01	Ni: <0,03	As: <0,02	CR Total: <0,03	pH: 4,5-5,5
Hg: <0,01	Pb: <0,02	Cu: <1,0		Da a 20°C: 1,00-1,200 g/L

COMPOSICIÓN	p/v
Macrocystis Pyrifera	20,0%
Zinc (Zn)	10,0%

Manejo del producto y Aplicación
 

BENEFICIOS:

- Corrector de deficiencias de Zinc.
- Precursor de aminoácido Triptófano, que ayudan en la formación de Auxinas.
- Favorece la viabilidad y fertilidad del grano de polen.
- Constituyente estructural y funcional de muchas enzimas.
- Clave para la captación y suministro del carbono atmosférico a los cloroplastos.
- Participa en el metabolismo de los carbohidratos, ayudando en la conversión de azúcares en almidón.
- Mantiene la integridad de las membranas celulares, otorgando mayor estabilidad a los tejidos, evitando estrés oxidativo.



FICHA TÉCNICA

Macrocystis Pyrifera

AgroVeca
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

AV Plus ZINC

MEZCLA DE FERTILIZANTE INORGÁNICO, COMPUESTO POR MICRONUTRIENTES + BIOESTIMULANTE.

La deficiencia de zinc se manifiesta principalmente en el amarillamiento intervenal de las hojas jóvenes, el reducido tamaño de las hojas y el acortamiento de los entrenudos, lo que da como resultado un crecimiento compacto. Detectar estos síntomas temprano permite aplicar correctivos para evitar mayores daños en la floración, el desarrollo de frutos y el rendimiento general de la planta.

AV PLUS ZINC contiene extractos de *Macrocystis pyrifera*, cuyos compuestos activos generan un efecto sinérgico actuando a nivel celular estimulando diversos procesos, ayudando a la planta a una mejor absorción, transporte de nutrientes y aumentando su poder antioxidante.

Para aplicación vía foliar agregar al estanque del equipo a media capacidad con el agitador funcionando y luego completar con el agua faltante.

FITOTOXICIDAD: No presenta toxicidad si se aplica según indicaciones de etiqueta y ficha técnica. No es tóxico para las plantas ni animales.

MOJAMIENTO

Frutales mayores.....1000-3500 L/ha.
Hortalizas, praderas, viveros..... 400-1000 L/ha.

*Puede variar según condiciones locales, tipo de cultivo específico y equipo de aplicación disponible.

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
FOLIAR
L/ha

Uva De Mesa, Vinífera, Pisquera, Kiwi.	1° aplicación a los 20 días antes del inicio de flor. 2° aplicación en plena flor 3° aplicación cuaja 4° aplicación bayas de 4-10 mm	0,5 - 3
Manzanos, Peral, Membrillo.	1° aplicación brotación/comienzo de floración. 2° aplicación caída de pétalos. 3° aplicación fruto cuajado. 4° aplicación en post cosecha, y según necesidad del cultivo.	0,5 - 3
Limón, Naranja, Mandarino, Pomelo, Tangelo, Olivo, Clementina, Palto.	Realizar de 4-8 aplicaciones durante el ciclo de cultivo, durante los periodos de activo desarrollo vegetativo y plena floración.	0,5 - 3
Cerezo, Ciruelo, Durazno, Damasco, Nectarín, Avellano, Almendro, Pistacho, Nogal, Pecano	1° aplicación botón floral. 2° aplicación en plena flor. 3° aplicación cuaja. 4° aplicación endurecimiento de carozo, evaluar aplicaciones de post cosecha según necesidad.	0,5 - 3

FICHA TÉCNICA

Macrocystis Pyrifera

AgroVeca
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
FOLIAR
L/ha

Granado, Higuera, Caqui, Chirimoyo, Papayo	1° aplicación en crecimiento de brote y/o botón floral. 2° aplicación post-cosecha, según requerimiento de cultivo.	0,5 - 3
Praderas.	Realizar 2-3 aplicaciones durante el periodo de desarrollo vegetativo	0,5 - 2,5
Remolacha azucarera	Realizar de 2-4 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo, comenzando desde la 4° hoja verdadera.	0,5 - 2,5
Flores de corte.	Aplicar al inicio de crecimiento de brotes.	0,5 - 2,5
Arándano, Frambuesa, Mora, Grosella, Fresa (Frutilla), Zarzaparrilla, Murta.	Realizar 3-6 aplicaciones durante el periodo de desarrollo vegetativo y durante periodos de floración.	0,5 - 3
Espinaca, Lechuga, Endivia, Acelga, Achicoria, Brásica, Alcachofa, Zanahoria, Apio, Cucurbitácea.	Realizar de 2-3 aplicaciones durante el periodo de desarrollo vegetativo a partir de primeras hojas verdaderas.	0,5 - 3
Cereales, Legumbre	1° aplicación a los 25-30 días post-emergencia, repetir según requerimiento del cultivo. Se recomienda una aplicación después de floración para mejorar calidad de grano y rendimiento.	0,5 - 3
Raps	1° aplicación elongación de tallos. 2° aplicación en 10% de flor.	0,5 - 3
Tomate, Pimentón, Ají, Paprika, Berenjena.	Realizar de 2-6 aplicaciones a partir de primeras hojas verdaderas y repetir en cada oleada de floración.	0,5 - 3

FICHA TÉCNICA

Macrocystis Pyrifera

AgroVeca
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
FOLIAR
L/ha

Papa, Aliícea,
Flor bulbosa.

Realizar 2-3 aplicaciones durante el periodo de desarrollo vegetativo, cada 15 días.

0,5 - 3

Espárrago.

Realizar de 3-4 aplicaciones comenzando desde la apertura de meristemo apical, repetir cada 20 días.

0,5 - 3

FORMATOS





Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a: contacto@agrovecalatam.com

Formulado en Chile por AGROVECA SPA.
Av. Membrillar N°50, oficina 39, Rancagua - Chile.

Distribuido por Agroveca Perú SAC.
Calle Martir Olaya Nro.129 Int.1905 - Lima - Lima - Miraflores.