

AV15 40-20

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE

AV15 40-20 es un formulado con una alta concentración de Fósforo y Potasio, enriquecido con extracto de algas marinas. **AV15 40-20** está diseñado para mejorar el desarrollo y la salud general de las plantas, optimizando la absorción y utilización de nutrientes esenciales. **AV15 40-20** promueve una estructura celular fuerte y un desarrollo radicular saludable, mejorando los procesos fisiológicos y bioquímicos, cruciales para el mantenimiento de la salud vegetal. Su contenido de extracto de algas marinas proporciona una acción bioestimulante.

CONTAMINANTES				
Metales Pesados (mg/kg)				Parámetros físicos - químicos
Cd: <0,01	Ni: <0,03	As: <0,02	CR Total: <0,03	pH: 3 - 4
Hg: <0,01	Pb: <0,02	Cu: <1,0		Da a 20°C: 1,078-1,278 g/L

COMPOSICIÓN	p/v
Fósforo (P ₂ O ₅)	40,0%
Potasio (K ₂ O)	20,0%
<i>Macrocystis Pyrifera</i>	20,0%
Aminoácidos libres	5,0%

Manejo del producto y Aplicación		
 AGITAR ANTES DE USAR	 VÍA FOLIAR	 VÍA RIEGO



BENEFICIOS:

- Mayor tolerancia a estrés abiótico.
- Raíces fuertes y desarrollo vigoroso de la planta.
- Mejora en la absorción y uso de nutrientes.
- Mantenimiento de altas tasas fotosintéticas bajo estrés.
- Frutos de mejor calidad y aumento del rendimiento.
- Mejor manejo de la sequía y eficiencia en el uso del agua.
- Actúa promoviendo la limpieza de haces vasculares, mejorando el transporte de agua y nutrientes a los frutos.



AV15 40-20

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS, FÓSFORO Y POTASIO.

AV15 40-20 debe aplicarse en momentos clave del ciclo del cultivo, especialmente durante el desarrollo vegetativo, la floración, el cuajado de frutos y ante situaciones adversas, para asegurar una mejor salud general, rendimiento y calidad en las plantas. Mejora la resistencia mecánica de las células, lo que refuerza la planta frente a agentes externos.

AV15 40-20 contiene extracto de alga (*Macrocystis pyrifera*), que actúa estimulando y equilibrando sus funciones metabólicas a nivel de las células de manera integral, desarrollando su potencial productivo frente al estrés abiótico. Este efecto se traduce en un adecuado desarrollo de la planta.

Para aplicación vía foliar agregar al estanque del equipo a media capacidad con el agitador funcionando y luego completar con el agua faltante.

Para aplicación vía riego agregar el producto al estanque de fertirriego y disolver, agitando vigorosamente, completar el volumen de agua necesario e inyectar al riego. Para una aplicación más eficiente, inyectar en la última etapa del riego, para dejar el producto en la zona de mayor concentración de raíces.

FITOTOXICIDAD: No presenta toxicidad si se aplica según indicaciones de etiqueta y ficha técnica. No es tóxico para las plantas ni animales.

MOJAMIENTO

Frutales mayores.....1000-3500 L/ha.
 Hortalizas, praderas, viveros..... 400-1000 L/ha.

*Puede variar según condiciones locales, tipo de cultivo específico y equipo de aplicación disponible.

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
FOLIAR
L/ha

DOSIS
RIEGO
L/ha

Uva de Mesa, Pisquera, Kiwi, Manzano, Peral, Membrillo, Ciruelo, Durazno, Damasco, Nectarín, Cerezo, Avellano, Granado, Nogal, Pecano, Almendro, Caqui, Higuera.

Realizar aplicaciones con brotes de 20 - 30 y repetir a los 15 días. Realizar una aplicación en post cosecha. realizar repeticiones según necesidad de cada cultivo

2 - 5

6 - 10

Limón, Naranja, Mandarin, Pomelo, Tangelo, Olivo, Clementina, Papayo, Palto.

1° aplicación al inicio de crecimiento de brote en primavera.
 2° aplicación de 10 a 14 días después.
 3° aplicación durante el crecimiento de brote de verano-otoño.

2 - 5

6 - 10

Praderas, Gramíneas.

1° aplicación 14 días después de emergencia.
 2° aplicación repetir a los 7-10 días.
 *2-3 aplicaciones en floración.
 *Repetir post-lluvia.

1 - 3

3 - 6

FICHA TÉCNICA

Macrocystis Pyrifera

AgroVeca
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
FOLIAR
L/ha

DOSIS
RIEGO
L/ha

Flores de corte.	1º aplicación desde octava hoja. 2º aplicación de 7-10 días después, máximo 3 aplicaciones.	1 - 3	3 - 6
Arándanos, Murta, Frambuesas, Moras, Grosellas, Fresa (Frutilla), Zarpaparrilla.	Aplicar en post cosecha, repetir a los 15 días	2 - 5	6 - 10
Lechuga, Apio, Endivia, Acelga, Achicoria, Espinacas, Alcachofas, Zanahoria, Brásicas.	1º aplicación desde trasplante. 2º aplicación a los 7-10 días. realizar de 2-5 aplicaciones según condiciones del cultivo. Repetir post-lluvias.	1 - 3	3 - 6
Aliáceas.	1º aplicación en almácigos a inicio de formación de bulbo. 2º aplicación a los 7-10 días, máximo de 3-5 aplicaciones. *Repetir post-lluvia.	1 - 3	3 - 6
Solanáceas.	1º aplicación a los 7-14 días post-trasplante. 2º aplicación a los 7-10 días después, máximos de 3 a 5 aplicaciones. *Repetir post-lluvia.	1 - 3	3 - 6
Cucurbitáceas.	1º aplicación desde la 4ta hoja. 2º aplicación 7 días después de cuaja. 3º aplicación a los 7-10 días después, máximo 4-6 aplicaciones. *Repetir post-lluvia.	1 - 3	3 - 6
Papas y Camote.	1º aplicación desde 6ta hoja. 2º aplicación a los 7-10 días después, máximo 4-6 aplicaciones. *Repetir post-lluvia.	1 - 3	3 - 6

FORMATOS





Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a: contacto@agrovecalatam.com

Formulado en Chile por AGROVECA SPA.
Av. Membrillar N°50, oficina 39, Rancagua - Chile.

Distribuido por Agroveca Perú SAC.
Calle Martir Olaya Nro.129 Int.1905 - Lima - Lima - Miraflores.