

AV - ALGAP 30

BIOESTIMULANTE

AV - ALGAP 30 está formulado en base a extractos de algas marinas, ricas en N - P - K, fitohormonas naturales, vitaminas y aminoácidos, lo que permite mantener a la planta en activo balance fisiológico. Actúa estimulando el metabolismo y equilibra sus funciones metabólicas a nivel de las células de manera integral, desarrollando su potencial productivo frente al estrés abiótico. Este efecto se traduce en un adecuado desarrollo de la planta.



CONTAMINANTES				
Metales Pesados (mg/kg)				Parámetros físicos - químicos
Cd: <0,01	Ni: <0,03	As: <0,02	CR Total: <0,03	pH: 5,5 - 6,5
Hg: <0,01	Pb: <0,02	Cu: <1,0		Da a 20°C: 1,256-1,456 g/L

COMPOSICIÓN	p/v
<i>Macrocystis Pyrifera</i>	30,0%
Azúcares de cadena larga	10,0%
Manitol	3,5%
Ácido alginico	3,0%

Manejo del producto y Aplicación		
 AGITAR ANTES DE USAR	 VÍA FOLIAR	 VÍA RIEGO

BENEFICIOS:

- Mantiene el activo crecimiento de la planta frente a situaciones de estrés.
- Alto nivel de azúcar, minerales y aminoácidos.
- Mejor absorción y aprovechamiento de los nutrientes a nivel foliar.
- Aporte de polisacáridos activadores de procesos fisiológicos.
- Activación de metabolismos secundarios para tolerar situaciones de salinidad y estrés hídrico.
- Promotor de cuaja y calibre de frutos.
- Acondicionador de suelos y activador de la microbiota nativa.
- Promotor de desarrollo radicular.



AV – ALGAP 30

BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS.

AV - ALGAP 30 debe aplicarse durante periodos de estrés abiótico (sequía, heladas, calor, salinidad) y en etapas de crecimiento activo como la floración y el desarrollo de frutos. También es útil tras el trasplante o cuando las plantas muestran crecimiento lento o desequilibrio fisiológico. Su fórmula ayuda a equilibrar el metabolismo y mejorar la resistencia de la planta para maximizar su productividad.

AV - ALGAP 30 contiene extractos de *Macrocystis pyrifera*, cuyos compuestos activos generan un efecto sinérgico actuando a nivel celular estimulando diversos procesos, ayudando a la planta a una mejor absorción, transporte de nutrientes y aumentando su poder antioxidante.

Para aplicación vía foliar agregar al estanque del equipo a media capacidad con el agitador funcionando y luego completar con el agua faltante.

Para aplicación vía riego agregar el producto al estanque de fertirriego y disolver, agitando vigorosamente, completar el volumen de agua necesario e inyectar al riego. Para una aplicación más eficiente, inyectar en la última etapa del riego, para dejar el producto en la zona de mayor concentración de raíces.

FITOTOXICIDAD: No presenta toxicidad si se aplica según indicaciones de etiqueta y ficha técnica. No es tóxico para las plantas ni animales.

MOJAMIENTO

Frutales mayores.....	1000-3500 L/ha.	*Puede variar según condiciones locales, tipo de cultivo específico y equipo de aplicación disponible.
Hortalizas, praderas, viveros.....	400-1000 L/ha.	

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS FOLIAR L/ha	DOSIS RIEGO L/ha
----------------------	---------------------

Durazno, Damasco, Ciruelo, Cerezo, Nogal, Almendro, Avellano, Pecano, Granado, Higuera, Caqui, Banano, Café, Cacao, Manzano, Peral, Membrillo.	3 a 4 tratamientos, cada 15 días inicio de floración e inicio de crecimiento vegetativo. Aplicaciones desde inicio de pinta y precosecha en estrés.	3	3 - 5
Limón, Naranja, Mandarina, Pomelo, Tangelo, Papayo, Clementina, Chirimoyo.	3 a 6 tratamientos en la campaña: inicio de crecimiento vegetativo, floración, pleno desarrollo vegetativo, aparición de frutos y poscosecha en estrés.	3	3 - 6

FICHA TÉCNICA

Macrocystis Pyrifera

AgroVeca
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
FOLIAR
L/ha

DOSIS
RIEGO
L/ha

Vid de mesa, Kiwi, Vid Vinífera y pisquera	2-3 tratamientos: inicio de crecimiento vegetativo en primavera, desarrollo vegetativo y en pinta (envero para uva de mesa)	3	3 - 5
Arándano, Frambuesa, Fresa (Frutilla), Mora, Murta, Grosella, Zarparrilla.	3 a 4 aplicaciones: inicio de crecimiento vegetativo de primavera, pleno desarrollo vegetativo, inicio de pinta y en precosecha en estrés.	3	3 - 5
Palto	3 a 10 aplicaciones cada 10 días por campaña, desde inicio de floración, y 30 días antes de cosecha.	3	3 - 10
Olivo	2-6 pasadas desde inicio de crecimiento vegetativo hasta crecimiento de frutos.	3	3 - 6
Tomate, Pimiento, Paprika, Berenjena, Ají, Lechuga, Espinaca, Acelga, Apio, Brócoli, Coliflor, Repollo.	Almácigos de 5 a 7 días después de trasplante, repetir cada 10 días.	1 - 2	3 - 10
Papa y Camote.	2-4 tratamientos desde desarrollo vegetativo hasta inicio de floración	1 - 2	4 - 6
Brócoli, Coliflor, Repollo.	Almácigos de 5 a 7 días después de trasplante, en pleno desarrollo vegetativo, desarrollo de panícula.	1 - 2	3 - 10
Cereales y Praderas	Aplicar al inicio de establecimiento de pradera y repetir cada 30 días. En maíz a partir de la segunda hoja verdadera.	1 - 2	3 - 5
Viveros y Ornamentales	Aplicar cada 15 - 20 días para mantener la planta fotosintéticamente activa durante su desarrollo vegetal. En situaciones de estrés realizar aplicaciones a dosis doble cada 5-7 días.	1 - 2	3 - 5

FORMATOS





Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a:
contacto@agrovecalatam.com

Formulado en Chile por AGROVECA SPA.
Av. Membrillar N°50, oficina 39, Rancagua - Chile.

Distribuido por Agroveca Perú SAC.
Calle Martir Olaya Nro.129 Int.1905 - Lima - Lima - Miraflores.