

AV MAX FULVIC 45%

ENMIENDA ORGÁNICA

AV MAX FULVIC 45% es una enmienda derivada de la leonardita, compuesta por ácidos fúlvicos. Mejora las condiciones físico - químicas del suelo, incrementando la capacidad de intercambio catiónico y facilita el crecimiento de raíces. Optimiza los programas de fertilización al acomplejar los nutrientes presentes en el suelo. Actúa como agente quelante, reduciendo la toxicidad de metales pesados y aumentando la disponibilidad de nutrientes esenciales.

CONTAMINANTES				
Metales Pesados (mg/kg)				Parámetros físicos - químicos
Cd: <0,01	Ni: <0,03	As: <0,02	CR Total: <0,03	pH: 5,5 - 6,5
Hg: <0,01	Pb: <0,02	Cu: <1,0		Da a 20°C: 0,958 - 1,158 g/L

COMPOSICIÓN	p/v
Ácidos Fúlvicos	45,0%
Carbono orgánico	23,60%
<i>Macrocytis Pyrifera</i>	15,0%
Nitrógeno (N)	1,3%

Manejo del producto y Aplicación



BENEFICIOS:

- Aumenta la capacidad de intercambio catiónico (CIC).
- Mejora la capacidad de resistencia frente a estrés abiótico.
- Produce agregados en el suelo que logran una mejor aireación.
- Estimula crecimiento radicular fortaleciendo la nutrición de las plantas.
- Mejora la biodisponibilidad de elementos esenciales.
- Aumenta la eficiencia de absorción y traslocación de nutrientes hacia los distintos órganos vegetales.
- Estimula el desarrollo de microorganismos que intervienen en los procesos suelo-planta.
- Tiene la capacidad de solubilizarse a todo rango de pH.
- Puede ser utilizado en una estrategia de lavado de sales y elementos fitotóxicos que depriman el crecimiento vegetal.



AV MAX FULVIC 45% | ENMIENDA DE ORIGEN ORGÁNICO LÍQUIDO A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y ÁCIDOS FÚLVICOS.

AV MAX FULVIC 45% debe aplicarse antes o durante la fertilización ya que mejora la eficiencia de los programas de fertilización al acomplejar nutrientes, haciéndolos más disponibles para las plantas y optimizando su absorción. Facilita el drenaje y el lixiviado de exceso de sales, mejorando la estabilidad de los agregados y favoreciendo el desarrollo radicular. Cuando se detectan niveles elevados de metales pesados, actúa como agente quelante, reduciendo la toxicidad de estos y protegiendo la salud de las plantas.

AV MAX FULVIC 45% contiene extracto de alga (*Macrocystis pyrifera*), que actúa estimulando y equilibrando sus funciones metabólicas a nivel de las células de manera integral, desarrollando su potencial productivo frente al estrés abiótico. Este efecto se traduce en un adecuado desarrollo de la planta.

Para aplicación vía riego agregar el producto al estanque de fertirriego y disolver en agua, agitando vigorosamente. Completar el volumen de agua necesario e inyectar al riego. Aplicar en segundo y tercer tercio de riego, según las condiciones de suelo: en suelos compactados, aplicar desde el segundo tercio, en suelos livianos o ya tratados, aplicar en último tercio. Para una aplicación más eficiente, inyectar en la última etapa del riego, para dejar el producto en la zona de mayor concentración de raíces.

FITOTOXICIDAD: No presenta toxicidad si se aplica según indicaciones de etiqueta y ficha técnica. No es tóxico para las plantas ni animales.

RECOMENDACIÓN DE USO		DOSIS RIEGO L/ha
Trigo, Avena, Cebada, Arroz, Praderas, Leguminosas.	Aplicar con equipo de barra al inicio de estado vegetativo. Seguir el manejo de suelo con inoculantes microbianos.	5 - 40
Cultivos en general	Para el lavado de sales ajuste la dosis según la salinidad del suelo; aumente el tiempo de riego en un 100% y aplique VEGA MAX FULVIC 45% durante todo el riego. consulte a su RTC zonal, Agrovecal Perú SAC, para más información.	10 - 80

FICHA TÉCNICA

Macrocystis Pyrifera

AgroVeca
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
RIEGO
L/ha

Lechuga, Apio, Endivia, Acelga, Achicoria, Espinaca, Brásicas, Cucurbitácea, Alcachofa, Papa, Poroto, Tabaco, Poroto Verde, Aliácea, Ajo, Flor Bulbosa, Ají, Habas, Remolacha, Pimentón, Tomate, Zanahoria, Espárrago, Ornamentales, Pimentón, Algodón, Flores Ornamentales, Pepino, Pepinillo.

Aplicar durante toda la temporada de riego, comenzando las aplicaciones previo al inicio de actividad radicular, ajustar número de aplicaciones dependiendo de la condición y tipo de suelo.

5 - 40

Hasta completar de 60 - 120 Litros por temporada.

Seguir el manejo de suelo con inoculantes microbianos.

Uva de Mesa, Vinífera, Pisquera, Banano, Membrillo, Manzano, Nogal, Caqui, Ciruelo, Papayo, Durazno, Nectarín, Damasco, Frambuesa, Cerezo, Avellano, Almendro, Clementina, Pecano, Kiwi, Olivo, Limón, Naranja, Mandarino, Frutilla, Piña, Café, Pomelo, Palto, Chirimoyo, Mora, Granado, Arándano, Murta, Grosella, Peral, Higuera, Cacao, Zarzaparrilla, Mango, Algodón, Pomelo.

Aplicar durante toda la temporada de riego, comenzando las aplicaciones previo al inicio de actividad radicular, ajustar número de aplicaciones dependiendo de la condición y tipo de suelo.

5 - 80

Hasta completar de 60 -120 Litros por temporada.

Seguir el manejo de suelo con inoculantes microbianos.

FORMATOS





Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a:
contacto@agrovecalatam.com

Formulado en Chile por AGROVECA SPA.
Av. Membrillar N°50, oficina 39, Rancagua - Chile.