

## FICHA TÉCNICA



### TIPO: ESPECIALIDAD/ BIOESTIMULANTE POTENCIADOR DE FLORACIÓN Y CUAJA.

#### Composición:

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Extracto de algas marinas ( <i>Macrocystis pyrifera</i> ) | 20,0% p/v  |
| * Auxinas.                                                |            |
| Boro (B).                                                 | 6,0 % p/v. |
| * Fuente de ácido Bórico complejo con Manitol.            |            |
| Zinc (Zn).                                                | 1,0 % p/v. |
| Densidad. :                                               | 1,064 g/cc |
| pH :                                                      | 6,0-6,5    |
| Solubilidad. :                                            | 100 %      |

**VECA BLOOM:** Bioestimulante líquido diseñado con una formulación especial que estimula y potencia los procesos fisiológicos de floración, cuaja y retención de fruto, contiene en su formulación un alto contenido de extracto de algas que van a fortalecer la capacidad antioxidante y aumentar la síntesis internas de fitohormonas. Contiene un efecto equivalente a 1500 ppm de Auxinas, alcanzando de esta manera un mejor potencial productivo.

#### BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Aporte de fitohormonas relacionadas con la floración, cuaja y retención de frutos.

Mayor eficiencia en la polinización-fecundación.

Mayor eficiencia del aparato fotosintético y retraso en la degradación de la clorofila.

Mayor producción de carbohidratos y distribución al órgano sumidero (flor-fruto).

Mayor diferenciación de haces vasculares (Xilema y Floema).

#### FITOTOXICIDAD:

No presenta ningún tipo de fitotoxicidad al aplicarlo siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

#### ALMACENAMIENTO:

Debe ser conservado bajo un ambiente fresco y seco.

Evitar temperaturas extremas.

## COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de extrema reacción ácida o alcalina, se recomienda hacer una pequeña prueba de compatibilidad antes de mezclar con otros productos.

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

No aplicar con temperaturas extremas.

### INDICACIONES DE APLICACIÓN

| CULTIVO                                                                                                                                                        | DOSIS<br>L/ha | MOMENTO DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uva De Mesa Vinífera y<br>Pisquera                                                                                                                             | 2-3           | Primera aplicación en pre-flor.<br>Segunda aplicación en flor.<br>Tercera aplicación cuaja y/o post-cuaja.<br>Cuarta aplicación en post-cosecha según requerimiento.                             |
| Manzanos, Peral,<br>Membrillo, Cerezos<br>Ciruelo, Durazno,<br>Damasco, Nectarín,<br>Avellano, Almendros,<br>Nogal, Pecano, Granados,<br>Olivos, Paltos, Kiwi. | 2-3           | Primera aplicación en pre-flor. 20-30% flor abierta.<br>Segunda aplicación en flor 50-60% abierta.<br>Tercera aplicación flor abierta.<br>Cuarta aplicación en post-cosecha según requerimiento. |
| Limonos, Naranjos,<br>Mandarinos, Pomelos,<br>Tangelos, Clementinas                                                                                            | 3             | Realizar dos aplicaciones: 50% flor abierta y plena flor.                                                                                                                                        |
| Chirimoyo                                                                                                                                                      | 1,5-2,5       | 1 a 2 aplicaciones a inicios de floración.                                                                                                                                                       |
| Plátano (Banano), Mango,<br>Café, Cacao.                                                                                                                       | 1,5-2,5       | Realizar de 2-3 aplicaciones antes de floración.<br>(Inicio de floración y el término de esta).                                                                                                  |
| Frutillas (fresas)                                                                                                                                             | 2-3           | Realizar primera aplicación en 50% flor abierta.<br>Segunda aplicación en plena flor.                                                                                                            |
| Arándanos, Frambuesas,<br>Moras, Grosellas,<br>Zarzaparrilla, Murta.                                                                                           | 2-3           | Primera aplicación en 50% flor abierta.<br>Segunda aplicación plena flor.<br>Tercera aplicación en post cosecha según requerimiento.                                                             |
| Leguminosas                                                                                                                                                    | 2             | Primera aplicación en 50% flor abierta.<br>Segunda aplicación en flor.<br>Tercera aplicación a inicios de crecimiento de las vainas.                                                             |
| Praderas, Caña De<br>Azúcar.                                                                                                                                   | 1,5-2,5       | Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo y después de cada corte.                                                                                                                             |
| Algodón                                                                                                                                                        | 2             | Realizar 2-3 aplicación antes durante y al termino de floración.                                                                                                                                 |

| CULTIVO                                                                                                                                    | DOSIS<br>L/ha | MOMENTO DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Granado, Higuera, Caqui,<br>Papayo                                                                                                         | 2-3           | Primera aplicación en 50% flor abierta.<br>Segunda aplicación plena flor.                                                                    |
| Papayo, Piña.                                                                                                                              | 2-3           | Realizar 2-3 aplicación antes, durante y al término de floración.                                                                            |
| Remolacha Azucarera                                                                                                                        | 2             | 1ª aplicación desde 6 a 8 hojas, segunda aplicación 14-21 días después.                                                                      |
| Flores de corte.                                                                                                                           | 2             | Aplicar a inicios de brotación y/o 50% flor abierta.                                                                                         |
| Apio                                                                                                                                       | 2             | 40 días después de germinado.                                                                                                                |
| Brásicas                                                                                                                                   | 2-3           | Antes del inicio de formación del pan, cada 7 días.                                                                                          |
| Lechuga, Endivia, Acelga,<br>Achicoria, Espinacas, Alcachofas,<br>Zanahoria, Pepinos, Pepinillos,<br>Achicoria, Repollo,<br>Cucurbitáceas. | 2-3           | Primera aplicación después de siembra/trasplante con suficiente área foliar.<br>Segunda aplicación en floración según necesidad del cultivo. |
| Cereales, Maíz, Maravilla.                                                                                                                 | 2-3           | Primera aplicación a los 30 días post emergencia.<br>Segunda aplicación 45 días post emergencia.                                             |
| Pimentón, Ají, Paprika,<br>Berenjena, Tomate.                                                                                              | 2-3           | Primera aplicación en inicio de floración.<br>Segunda aplicación con fruto recién cuajado.                                                   |
| Papas, Papa Camote                                                                                                                         | 2-3           | Aplicar a los 20-35-50 días post-emergencia.                                                                                                 |
| Aliáceas, Flores Bulbosas                                                                                                                  | 2             | Aplicar a los 20-35-50 días post-emergencia.                                                                                                 |
| Raps                                                                                                                                       | 2-3           | Primera aplicación en estado de roseta.<br>Segunda aplicación floración.                                                                     |
| Espárragos                                                                                                                                 | 2-3           | Aplicar a la apertura de meristema apical.                                                                                                   |
| Plantas Ornamentales                                                                                                                       | 2-3           | Aplicar antes de prefloración.                                                                                                               |

\*Nota: Se recomienda aplicación en conjunto a VECA BALANCE para un mejor resultado.



Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a:  
**[contacto@agroveca.com.pe](mailto:contacto@agroveca.com.pe)**

Formulado en Chile por AGROVECA SPA.  
Av. Membrillar N°50, oficina 39, Rancagua - Chile.



Distribuido por **Agroveca Perú SAC**.  
Pasaje Mártir Olaya N° 129 piso 19 Dpto./Int. 1905 Urbanización Residencial  
Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima.